

**Ipren®**  
Effektiv mod  
muskel- og ledsmerter  
samt menstruations-  
smerter.



**Pinex® junior**  
Med jordbærsmag  
og praktisk  
doserings-ske.  
Uden alkohol og  
sukker.



**Ibutop®**  
Smertestillende  
til ømme muskler  
og led. Lindrer  
lokalt på det  
ømme sted.



September er overgangsmåned, hvor vi så småt begynder at trække indendørs og forberede os på efterårets komme. På apoteket kan du bl.a. få vejledning om vitaminer, lindring af forkølelsessymptomer – kort sagt mange gode råd til, hvordan du og din familie kan gå efteråret velforberedt i møde.

**Ipren®** (ibuprofen), filmovertrukne tabletter. Anvendelse: Svage smerter. **Dosering:** Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. **Må ikke anvendes:** Ved overfølsomhed overfor ibuprofen eller et eller flere af indholdstofferne. Ved sår i mave-/tarmkanalen, blodning i mavetarmkanalen, tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, tidligere tilfælde af astma, nældefeber eller andre overfølsomhedsreaktioner overfor acetylsalicylsyre eller lignende smertestillende stoffer. Ved meget nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion, blødningstendens. Under graviditet i 3. trimester. **Forsigtighedsregler:** Samtidig anvendelse af acetylsalicylsyre, COX-2 hæmmere, andre NSAID-præparater, digoxin og methotrexat sammen med ibuprofen bør undgås. Ved samtidig behandling med blodfortyndende midler, ACE-hæmmere, furosemid, thiazider, beta-blokkere, kortikosteroider, lithium, ciclosporin, trombocytæmmende midler, SSRI, abciximab, tirofiban, integrilin, clopidogrel, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba. Ved fortilfælde af forhøjet blodtryk og/eller alvorlig nedsat hjertefunktion. Bør ikke anvendes af kvinder der planlægger at blive gravide. **Graviditet og amning:** Graviditet: Må ikke anvendes i de sidste tre måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes. **Bivirkninger:** Meget almindelige: Fordøjelsesbesvær. Diarré. Almindelige: Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed, tinnitus, blodning fra mave-/tarmkanalen, blod i opkast, sortfarvet afføring, mavesmerter, tarmulft, træthed, mave-/tarmgener som kvalme, opkastninger, ubehag i bughulen, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og mavekramper, eksem, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Hjertesvigt (hos patienter med begrænset hjertefunktion), forandring i blodbilledet, tøleforstyrrelser, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelse, astmatiske anfald, stakåndethed, sår i mave-/tarmkanalen, tyktarmsbetændelse, inflammatoriske tarmsygdomme, mavekatar, halsbrand, påvirkning af nyrefunktion, nyrebetændelse, udslæt, blodudtrængning i huden, kløe, lysfølsomhed af huden, løbende næse, forhøjet blodtryk, allergiske og anafylaktiske reaktioner, leverbetændelse, gulsot, påvirkning af lertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, let rastløshed. Sjældne: Sløvhed, motoriske forstyrrelser, betændelse af synsnerve, nyreskader, blærefuld udslæt, nældefeber, meningitis, kulderystelser, feber, leverskade, depression, konfusion, koncentrationsbesvær, kognitiv påvirkning. Meget sjældne: Bronkospasme, betændelse af bugspytkirtlen, forværring af Crohns sygdom, alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder hudreaktioner, hårtab, sygdomme i hår og negle, skoldkopper, karbetændelse, anafylaktisk shock, leversvigt. Pakninger og priser pr. juli 2010: Tabletter 200 mg 20 stk. kr. 22,00 (vej.), 50 stk. kr. 43,80, 100 stk. kr. 55,30. For dagsaktuelle priser se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk) Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf: 46 77 11 11. Fax 46 75 66 40. [www.nycomed.dk](http://www.nycomed.dk) **Ibutop® ibuprofen 50 mg/g creme.** Indikation: Anvendes mod lokale inflammatoriske lidelser. Virker betændelsesnedsættende og smertestillende. **Dosering:** 4-10 cm IBUTOP® creme svarende til 1,6 - 4 g creme masseres ind i huden på det angrebne område 3-4 gange dagligt. Det anbefales at vaske hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne behandles. **Bivirkninger:** Almindelig: Rødmme, udslæt, kløe eller andre eksem-lignende irritationer. Sjældne: Bronkospasmer, blæredannelse på huden, nældefeber. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Bør ikke anvendes af patienter, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAID produkter fremkalder symptomer på bronkospasmer, angioødem, astma, snue eller nældefeber. **Særlige advarsler:** Bør ikke anvendes ved eksem, akne, inficeret hud, åbne sår eller komme i kontakt med slimhinder og øjne. Bør ikke kombineres med andre lægemidler til anvendelse på huden. **Graviditet og amning:** Bør ikke benyttes af gravide. Kan anvendes under amning. **Pakninger og priser pr. juni 2010:** 50 g: kr. 59,40 kr, 100 g: 108,20 kr. Læs altid oplysningerne i indlægssedlen omhyggeligt. Udlevering: HF. Dansk repræsentant: Actavis Nordic A/S, Ørnegårdsvæg 16, DK-2820 Gentofte. Tlf. 7222 3131. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. Læs mere om Ibutop® på [www.actavis.dk](http://www.actavis.dk) **Pinex® Junior** (paracetamol). Anvendes ved svage smerter. Virker febernedsættende. **Dosering:** Børn: 50 g/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Kontraindikation: Svær leverinsufficiens. Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne. Forekomne bivirkninger er urticaria og forøget levertransaminase. **Følg vejledningen på pakningen eller lægens anvisning.** Bemærk: Paracetamol i doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også leversvigt og død. Man bør være opmærksom på samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin, især til børn. Giv aldrig børn under 2 år medicin uden lægens anvisning. Pakninger og priser JUNI. 2010 (excl. recepturgebyr): Pinex Junior oral opløsning à 24 mg/ml 60 ml: 26,05 kr og 200 ml: 46,20. Pinex Junior Suppositorier à 125 mg 10 stk.: 30,25 kr., à 250 mg 10 stk.: 30,25 kr. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Lægemiddelstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. For dagsaktuelle priser se [www.medicinpriser.dk](http://www.medicinpriser.dk).